对于卡贝缩宫素静脉[illegible]

[illegible]0支/盒。[illegible]装。1支/盒；6支/盒；[illegible]

给产后7～14周的哺乳妇[illegible]

[illegible]

[illegible]平均分布容积（Vz）为22 L。卡贝缩宫素原型的肾清除率较低，[illegible]泄的卡贝缩宫素原型为<1%的注射剂量。

对5名健康哺乳母亲肌肉注射70 μg[illegible]，乳汁样品中可检出卡贝缩宫素浓度。乳汁中的主峰浓度低于20 pg/mL，比120分钟时的血浆浓度低约56倍。

【药理毒理】

[illegible]

[illegible]当孕妇分娩后，单次静脉注射卡贝缩宫素100微克就足以维持充分的子宫收缩，以预防分娩后产生的子宫无力和产后出血过多，[illegible]持续输注数小时的缩宫[illegible]。

毒理研究

遗传毒性：

卡贝缩宫素Ames试验、小鼠淋巴瘤TK试验、体外和体内染色体断裂[illegible]

由于已经发现前列腺素增强缩宫素效应，因此预计卡贝缩宫素也[illegible]效应。因此，不建议前列腺素和卡贝缩宫素同时使用。如果它们伴[illegible]药，应小心监测患者。

一些吸入麻醉剂，如氟烷和环丙烷可以增强降[illegible][illegible]经报告缩宫素产生心律失常[illegible]

【药物过量】

卡贝缩宫素过量可能产生子宫机能亢进[illegible]